



ATT.NE personale ATA e Docente

Att.ne genitori

COMUNICAZIONE 129

OGGETTO : malattie

La prevenzione e il controllo delle infezioni in ambiente scolastico sono fattori molto importanti che , per essere affrontati in modo adeguato necessitano della collaborazione fra la scuola, la famiglia e i pediatri.

Nelle scuole, infatti, bambini e ragazzi trascorrono molte ore a stretto contatto fisico, favorendo la trasmissione degli agenti infettivi.

La presenza a scuola per tutti è assolutamente sconsigliabile quando:

- le condizioni di salute sono tali da non permettere la partecipazione attiva dello studente allo svolgimento delle attività (*per presenza di febbre, astenia, tosse fastidiosa e continua, e/o difficoltà respiratoria, pianto persistente, insorgenza di un esantema che progredisce rapidamente*)
- lo studente/personale scolastico presenta vomito (due o più episodi nelle precedenti 24 ore) o diarrea (più di tre scariche liquide in 3 ore), eventualmente con muco o sangue; •
- lo studente/personale scolastico è affetto da congiuntivite (con occhi arrossati, lacrimazione, secrezione catarrale o purulenta, gonfiore delle palpebre), per cui è necessario sottoporlo a specifico trattamento il più precocemente possibile;
- la malattia ha un'alta contagiosità (si precisa che per tutte le malattie infettive – morbillo, varicella, pertosse, eccetera – esistono specifiche norme igienico sanitarie);
- lo studente presenta malessere fin dalle prime ore del mattino (a maggior ragione se dalle ore notturne), in modo da poter valutare l'evoluzione del suo stato di salute nelle ore successive

Ogni genitore dovrebbe non solo farsi carico del proprio figlio per il necessario periodo di cure a casa, ma anche essere sensibile alla tutela della salute della comunità infantile di cui il bambino o lo studente fanno parte.

Per quanto concerne le malattie esantematiche si pubblica la tabella specifica

Tabella 2. Raccomandazioni sui periodi di esclusione dalla frequenza scolastica in corso di malattie infettive del MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO

MALATTIA	RACCOMANDAZIONI SUI PERIODI DI ESCLUSIONE DALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Varicella	5 giorni dall'esordio dell'esantema
Morbillo	5 giorni dall'esordio dell'esantema
Rosolia	7 giorni dall'esordio dell'esantema
Parotite	9 giorni dall'esordio
Pertosse	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico
Scarlattina	5 giorni dall'inizio del trattamento antibiotico
Pediculosi del capo	Fino all'avvio del trattamento certificato dal medico curante



Ameba	le persone con diarrea dovuta all'amebiasi non devono frequentare la scuola o andare al lavoro fino a quando le feci non siano tornate normali a seguito di cura
-------	--

Si ricorda a tutti come lavare bene le mani e una corretta igiene personale siano fondamentali.

Si ricorda, inoltre, che per essere riammessi a scuola dopo un periodo di assenza superiore ai 5 gg

BISOGNA PRESENTARE AI DOCENTI CERTIFICATO MEDICO

Si ringraziano tutti per la collaborazione

SUBJECT: Illnesses

Infection prevention and control in schools are very important factors that, to be addressed appropriately, require collaboration between the school, families, and pediatricians.

In schools, children and adolescents spend many hours in close physical contact, favoring the transmission of infectious agents.

Attendance at school is absolutely inadvisable for everyone when:

- the student's health conditions are such that they cannot actively participate in activities (*due to fever, fatigue, a persistent and annoying cough and/or difficulty breathing, persistent crying, or the onset of a rapidly progressing rash*)
- the student/school staff member is vomiting (two or more episodes in the previous 24 hours) or HAS diarrhea (more than three loose stools in three hours), possibly containing mucus or blood;
 - the student/school staff member is suffering from conjunctivitis (with red eyes, tearing, catarrhal or purulent discharge, swelling of the eyelids), for which specific treatment is necessary as soon as possible;
- the disease is highly contagious (please note that for all infectious diseases—measles, chickenpox, whooping cough, etc.—specific hygiene and health regulations exist);
- the student is feeling unwell from the early hours of the morning (even more so if it begins at night), so that the evolution of their health can be assessed over the following hours.

Every parent should not only take care of their child during the necessary period of home care, but also **be sensitive to the health of the SCHOOL community**

Regarding exanthematous diseases, a specific table is published

Table 2. Recommendations on periods of exclusion from school attendance during infectious diseases from the ITALIAN MINISTRY OF HEALTH

MALATTIA	RACCOMANDAZIONI SUI PERIODI DI ESCLUSIONE DALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Chickenpox	5 days from the onset of the rash
Measles	5 days from the onset of the rash
Rubella	7 days from the onset of the rash



Mumps	9 days from the onset of the rash
Pertussis	5 days from the start of antibiotic treatment
Scarlet fever	5 days from the start of antibiotic treatment
Head lice	Until the start of treatment certified by the attending physician
Ameba	People with diarrhea due to amoebiasis should not attend school or go to work until their stools have returned to normal following treatment.

Everyone is reminded that proper hand washing and personal hygiene are essential.

We also remind you that to be readmitted to school after an absence of more than 5 days, you **MUST PRESENT A MEDICAL CERTIFICATE TO TEACHERS.**

We thank everyone for their cooperation.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Marina Venturella